

À la Clinique des femmes de l'Outaouais, nous offrons deux types d'interruption de grossesse. Voici un tableau comparatif à lire attentivement pour vous aider à choisir la méthode qui vous convient le mieux. Sachez qu'il est possible que vous ne soyez pas éligible à l'interruption de grossesse par médicaments pour diverses raisons, vous pourrez en discuter avec l'infirmière.

Foire aux questions	Interruption de grossesse par chirurgie	Interruption de grossesse par médicaments
À combien de semaines peut-on effectuer l'interruption de grossesse ?	Entre la 6 ^{ième} et la 15 ^{ième} semaine de grossesse.	Dès le test urinaire positif jusqu'à la 9 ^{ième} semaine de grossesse.
Comment aura lieu l'interruption de grossesse ?	Dilatation du col de l'utérus, aspiration de la grossesse et curetage, effectués par un médecin.	1 comprimé de mifépristone et 4 comprimés de misoprostol 24 à 48 heures suivant la prise de mifépristone.
Où aura lieu l'interruption de grossesse ?	À la Clinique	À la Clinique et à votre domicile
Combien de visites requises pour cette méthode ?	Requiert au minimum 2 visites. La 1 ^{ère} avec l'infirmière et une 2 ^{ième} pour l'intervention avec le médecin.	Requiert au minimum 3 visites. La 1 ^{ère} avec l'infirmière, une 2 ^{ième} avec un médecin et une 3 ^{ième} pour faire un suivi.
En combien de temps s'effectue l'interruption de grossesse ?	En quelques minutes, en moyenne entre 5 et 7 minutes.	Entre 2 et 3 jours.
Quel est le pourcentage de réussite ?	Plus de 99% ¹	Entre 94.3% et 98% ² , un curetage serait alors nécessaire.
Est-ce que j'aurai de la douleur ?	Les femmes ont généralement des douleurs légères à modérées.	Les femmes ont généralement des douleurs modérées à sévères.
Quelles sont les méthodes offertes pour soulager la douleur ?	Une sédation consciente induite par 2 médicaments intraveineux. Il y a aussi une anesthésie locale du col de l'utérus.	Analgésiques à prendre par voie orale à domicile.
Quels sont les effets indésirables de la médication ?	Il y a une possibilité de nausée, vomissement, chute de pression artérielle, somnolence et difficulté respiratoire.	Il y a une possibilité de nausée, vomissement, diarrhée et frissons.
Est-ce qu'il y aura des saignements ?	Certaines femmes n'ont aucun saignement, d'autres en ont des légers à modérés durant une période allant jusqu'à 3 semaines.	Oui, il y aura des saignements. Ils seront de modérés à sévères au début puis légers par la suite durant une période allant jusqu'à 3 semaines.
Quels sont les complications possibles ?	Elles sont rares mais possibles, incluant l'hémorragie, l'infection et la perforation de l'utérus.	Elles sont rares mais possibles incluant l'hémorragie sévère.
Quels sont les principaux avantages ?	Intervention courte, douleur contrôlée par médicaments intraveineux et saignements habituellement peu importants.	Accessible précocement dans la grossesse. Expulsion de la grossesse dans l'intimité du domicile.
Quels sont les principaux désavantages ?	Accompagnement obligatoire pour le retour à la maison.	Processus plus lent. Douleur et saignements importants. Visite de contrôle obligatoire. Interruption chirurgicale nécessaire dans 5% des cas.

¹ INESSS, Adapté de Niinimäki et al., 2009.

² Monographie du Mifegymiso, révision du 6 novembre 2017.